

Fungicidní ochrana cukrovky - cerkosporová listová skvrnitost - náměty 2026

Fungicid	Účinné látky	Dávka l/ha	Perzistence (odhad)
Propulse	Fluopyram 125g, prothiocoazole 125g	1,0-1,2	21 dní
Alonty	Mefentrifluconazole 100 g /l Fluxapyroxad 50 g/l	0,8-1,0	21 dní
Amistar Gold Mirador Uni	Azoxystrobin125g, difenoconazole125g	1,0	21 dní
Makler	Azoxystrobin 250 g	1 l	14 dní
Eminent, Bagani, Jamoto	Tetraconazole 125g	0,8	14 dní
Dafne 250 EC, Difure Solo, Aldifol 250 EC	Difenoconazole 250g	0,4 0,5 0,32-0,4	14 dní
Difure XL	Difenoconazole 500g	0,25	14 dní
Belanty	Mefentrifluconazole 75 g /l	1,5 l spolu s 3kg KUMULUS	14 dní
Spyrale	Difenoconazole 100g Fenpropidin 375 g	1,0	14 dní
Panorama	Prothiconazole 250g, metkonazole 90g	0,6	14 dní
Tern	Fenpropidin 750g/l	0,5	10 dní
Pyrabos	Boscalid 267g/kg, pyraclostrobin 67g/l	1,2	14-21 dní
Maganic	Difenoconazole 125 g Prothiconazole 175 g	0,8	14 dní
Queen	Fenpicoxamid 50 g prothiocoazole 100 g	1,5	21 dní

Další pomocné látky a listová hnojiva (vhodné zvl. v oblastech s výskytem rezistentních populací *C. beticola* ke strobilurinům jako tank-mix s dalším fungicidem):

Alicuprin (oxychlorid mědi 377,5 g/l), listové hnojivo, dávkování 1,6-2,6 l/ha, **Belcup** (oxychlorid Cu 377g/l) dávkování 1,6-2,6 l/ha. **FlowProfi** (oxychlorid Cu 645g/l) dávkování 1,25-2,5 l, **FlowExpert** (oxychlorid mědi 675 g/l, betain 200g/l) listové hnojivo, dávkování 1,25-2,5 l/ha.

Reef (vodorozpustná měď ve formě trojsytného síranu, Cu 80g/l, S 640g/l) listové hnojivo s fungicidními účinky. Registrované dávkování až 5 x 5,5 l/ha. Doporučené dávkování výrobce pro cukrovku 2-4 x 5 l/ha ve 300-400 l vody dle signalizace.

POZOR u přípravků obsahujících měď nepřekročit dávku Cu 4 kg/ha/rok

Ochrana se provádí dle signalizace DIK – denní infekční koeficienty po potvrzení prvního výskytu v dané oblasti (např. Cromptech, ing. Alena Bezdíčková).

T1 –po potvrzeném výskytu v oblasti a splněných podmínkách pro šíření patogena DIK, kalendářně obvykle od 5. do 20.7., dle vývoje vegetace a průběhu počasí

T2 obvykle po 2-3 týdnech, T3 po 2-3 týdnech (kvůli OL do pol. září ...)

Aplikace vhodnější ráno, než v průběhu dne a navečer za vysokých teplot (silný odpar). Dávka vody 300 – 400 l/ha. Možnost tank-mix s listovými hnojivy (bór aj.). Listová hnojiva fungují částečně jako smáčedla.

Informace jsou orientační, vždy se řiďte platnou etiketou přípravku!